

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора  
ЗАО «Консул»  
  
С.П. Шкутович



## Инструкция по применению санитарно-дезодорирующего средства «Дезосан Натура»

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Дезосан Натура
- 1.2. Порошок от серого до розово-серого цвета с резким специфическим запахом.
- 1.3. Средство содержит сульфат кальция, каолин, бентонит, сульфат железа, фосфорную кислоту и отдушку.
- 1.4. Средство выпускают расфасованным по 10 кг или 25 кг в бумажных мешках с внутренним слоем из полиэтиленовой пленки или в пакетах из полимерных материалов.
- 1.5. Средство хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения средства - 12 месяцев с даты изготовления.

### 2. САНИТАРНО-ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. Дезосан Натура - сухое санитарно-дезодорирующее средство, обладающее высокой сорбирующей способностью в отношении влаги и вредных газов.
- 2.2. Дезосан Натура абсорбирует мочевины из мочи, экскрементов животных и предотвращает преобразование мочевины в аммиак, связывает другие токсические соединения, присутствующие или образующиеся в процессе разложения органических веществ, продукты разложения (сероводород, скатол, индол), тем самым оказывает дезодорирующее действие в помещении.



### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Средство применяют с целью восстановления санитарной чистоты в животноводческих помещениях, на объектах содержания всех видов животных и птицы в их присутствии.

3.2. Дезосан Натура может применяться в качестве подстилки в репродукторах, маточниках на свиноводческих и птицеводческих объектах. Средство первоначально применяют три дня подряд, затем один - два раза в неделю. В свиноводстве рекомендовано для обтирания новорожденных поросят.

3.3. Средство равномерно рассыпается на обрабатываемой поверхности (подстилке, бетонных или деревянных полах и др.) в количестве 40,0-100,0 г/м<sup>2</sup>. Перед укладкой подстилки при опоросах, отелах и постановки птицы средство применяется в количестве 100,0 г/м<sup>2</sup>. В свиноводстве средство применяют один раз в день, три дня подряд еженедельно. В помещениях для содержания других видов животных и птицы средство используют один-два раза в неделю. В родильных отделениях средство применяют ежедневно.

3.4. Побочные действия отсутствуют. Средство безвредно для животных даже в тех случаях, когда оно в небольших количествах попадает в желудок животных вместе с кормом.

3.5. Противопоказания: средство не следует смешивать или применять вместе с дезинфицирующими препаратами, содержащими кальция гидроксид (гашеную известь), натрия гидроксид (каустическую соду) и натрия карбонат (кальцинированную соду).

3.6. Средство не влияет на качество животноводческой продукции. Средство не накапливается в организме животных.

### 4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе со средством соблюдать меры личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

### 5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

5.1. ЗАО «Консул» (Республика Беларусь, г. Брест, ул. Высокая, 18/1).

Начальник ветеринарного отдела  
ЗАО «Консул»



Д.В. Потапчук

