



РУ НОМЕР: РК-ВП-4-5012-23

Стерильно

Амоксиген

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ

【Название ветеринарного препарата】

Общепринятое название: Амоксициллина тригидрат и Гентамицина сульфат суспензия для инъекций

Торговое название: Амоксиген суспензия для инъекций

Наименование на английском языке: Amoxicillin trihydrate with gentamicin sulfate suspension for injection

【Состав】

Содержится в 1 мл:

Амоксициллина тригидрат 150 мг

Гентамицина сульфат 40 мг

Гидрогенизированное касторовое масло 3 мг

Соевое масло 0,4 мг

Этилолеат до 1 мл

【Характеристика】

Суспензия для инъекций белого цвета с возможным желтоватым или сероватым оттенком.

【Фармакологическое действие】

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата Амоксиген, является полусинтетическим антибиотиком пенициллинового ряда и активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp., Proteus mirabilis, Leptospira spp. Механизм бактерицидного действия антибиотика заключается в нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

Второй активный компонент – Гентамицина сульфат – является антибиотиком аминогликозидного ряда. Он подавляет бактериальный синтез белка микроорганизмов и высокоактивен в отношении грамотрицательных аэробных бактерий, включая Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., а также аэробных грамположительных кокков, устойчивых к пенициллинам и другим антибиотикам.

Фармакокинетические свойства. После внутримышечного введения препарата максимальные концентрации амоксициллина тригидрата и гентамицина сульфата в сыворотке крови животных, достигаются через 1-2 часа и 30-40 минут, соответственно, и удерживаются на терапевтическом уровне в течение 24-48 часов. Активные компоненты препарата выводятся из организма преимущественно в неизменном виде с мочой и желчью.

【Показания】

Амоксиген назначают с лечебной целью крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям и овцам при заболеваниях бактериальной этиологии, включая болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы, суставов и других первичных и вторичных бактериальных инфекциях, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами чувствительными к амоксициллину и гентамицину.

Для ветеринарного применения



РУ НОМЕР: РК-ВП-4-5012-23

Стерильно

【Дозировка и способ применения】

Для обеспечения правильной дозировки вес животного должен быть определен настолько точно, насколько это возможно. Перед использованием необходимо тщательно взболтать флакон с суспензией в течение 1-2 минут.

Амоксиген вводят животным один раз в сутки внутримышечно в дозировке 1 мл на 10 кг массы животного (15 мг амоксициллина и 4 мг гентамицина на 1 кг массы животного). Продолжительность курса лечения, в зависимости от тяжести течения заболевания, составляет 2-5 суток.

Максимальный объем препарата при введении в одно место не должен превышать 20 мл для КРС и лошадей, 10 мл для свиней, овец и телят, 5 мл для поросят.

【Побочные действия】

При применении амоксигена в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. У отдельных животных может проявляться болезненность в месте инъекции, которая проходит самопроизвольно и не требует применения лекарственных средств. В случае появления аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

【Противопоказания】

Противопоказанием к применению Амоксигена является гиперчувствительность животных к аминогликозидам и бета-лактамам антибиотикам (в том числе в анамнезе), а также в случае тяжелой почечной недостаточности.

Не допускается одновременное применение Амоксигена с другими ото- и нефротоксичными средствами, а также с миорелаксантами и бактериостатическими препаратами – макролидами, хлорамфениколом, тетрациклинами и сульфаниламидами.

【Меры предосторожности】

Меры предосторожности для целевых животных. Не использовать внутривенно. Всегда использовать сухой шприц. Не следует разбавлять препарат и смешивать его с другими препаратами. Избегать загрязнения препарата во время применения.

【Время выведения препарата】 Мясо: 30 суток; молоко: 4 суток.

【Спецификация】 50мл, 100 мл.

【Упаковка】 1 флакон в коробке.

【Условия хранения】

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. и защищенном от света месте при плотно закрытом состоянии. Хранить в недоступном для детей месте. Вскрытые флаконы с препаратом можно хранить не более 28 суток при условии хранения в темном месте при температуре от 2°C до 8°C.

【Срок годности】 3 года с даты производства.

【Производитель】

HEBEI LIHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD

Адрес: № 1. Шуанцзин восточная дорога, Ул. Вост-Хэпинг, СиньЛэ Шуанцзин южная развитая зона,г. Шицзячжуан, пр. Хэбэй, КНР

Для ветеринарного применения