

Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом Минсельхозпрода
Республики Беларусь,
протокол № 87 от 18 ноября 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата Толтразор® 2,5%
раствор для орального применения

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Толтразор® 2,5% (Toltrasorum® 2,5%).
- 1.2 Препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета. В 1 мл препарата содержится 25 мг толтразурила.
- 1.3. Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100, 500, 1000 и 2500 мл.
- 1.4. Препарат хранят с предосторожностью по списку Б при комнатной температуре от плюс 15°C до плюс 25°C в сухом, защищенном от света месте.
- 1.5. Срок годности препарата - 3 года от даты изготовления при указанных условиях хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 ТОЛТРАЗОР® 2,5% раствор для орального применения содержит в своем составе в качестве активного вещества толтразурил. Толтразурил эффективен в отношении видов Eimeria, вызывающих эймериоз у кур и индеек.
- 2.2 Механизм действия препарата заключается в ингибировании клеточного деления шизонтов и микрогамонтов, за счет ингибирования ряда ферментов, участвующих в синтезе примидина и клеточном дыхании. После терапии у птиц сохраняется иммунитет против эймериоза за счет того, что препарат эффективен и против внутриклеточных стадий Eimeria.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Препарат применяют для лечения и профилактики эймериоза у кур и индеек.
- 3.2 Для лечения эймериоза (кокцидиоза) суточный объем ТОЛТРАЗОР® 2,5% применяют два дня подряд в фармакологической дозе 7 мг/кг массы тела, т.е. 28 мл препарата (эквивалент 700 мг толтразурила) на 100 кг массы тела.
Толтразор® 2,5% добавляют в питьевую воду. Приготовленный раствор остается стабильным в течение 24 часов. Препарат можно применять в первый и во второй день по любой из следующих двух схем:
 - 1) Толтразор® 2,5% раствор для орального применения добавляют в питьевую воду в суточном объеме и выпаивают птице в течение 2 дней.
 - 2) В первый и во второй день препарат добавляют в питьевую воду в объеме, потребляемом за 8 часов, и выпаивают птице. В оставшиеся часы птиц обеспечивают чистой питьевой водой. В случае необходимости курс лечения проводят повторно через 5 дней.
- 3.3 Побочные (нежелательные) эффекты при назначении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдаются.
- 3.4 Толтразор® 2,5% запрещен к применению на территории Республики Беларусь для птиц, яйца которых используются в пищу людям.
- 3.5 Время ожидания. Убой кур и индеек на мясо не разрешается в период проведения терапии и в течение 21 суток после последнего применения препарата. До указанного срока мясо вынужденно убитых животных следует использовать на корм пушным зверям.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, к которому относится территория, где используется препарат.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм птиц, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель: Арион Илач Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети, Тузла Организе Санайи Белгеси, 12-ый проспект, № 8, Тепеорен Тузла/Стамбул Турция для УОРЛД ВЕТ Илач Сан. ве Тидж. Лтд. Шти, ТУРЦИЯ

Инструкция по применению препарата Толтразор®2,5% разработана сотрудниками «Уорлд Вет Илач Сан. ве Тидж. Лтд. Шти» и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» Красочко П.А., Борисовец Д.С.

