



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А.Непоклонов

20 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Досто Грина для улучшения поедаемости кормов
сельскохозяйственными животными, в том числе птицами
(организация-производитель «Dostofarm GmbH»/ «Достофарм ГмбХ», Германия)

I. Общие сведения

1. Досто Грин (Dosto Green) - добавка кормовая для улучшения поедаемости кормов сельскохозяйственными животными, в том числе птицами.
2. Досто Грин содержит действующие вещества – тимол 1,0-3,5 %, карвакрол 60-63% входящие в составе эфирного масла орегано 6,0-9,0%, в качестве вспомогательного вещества очищенную диатомовую землю (E551с) - до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой мелкий порошок серого цвета нерастворимый в воде с пряным ароматным запахом.
4. Досто Грин выпускают расфасованным по 25 кг в запечатых 4-х слойных бумажных крафт-мешках с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя и ее адреса, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, сведений о сертификации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Досто Грин в упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от света при температуре от 10 °С до 25 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. После вскрытия упаковки, упаковку рекомендуется плотно закрыть во избежание потери активного компонента.

Досто Грин по истечении срока хранения не должен применяться.

II. Биологические свойства

5. За счет входящего в состав натурального масла орегано Досто Грин способствует улучшению функционирования пищеварительного тракта и поддержанию здоровой флоры кишечника, следственно способствует укреплению иммунной системы.

Улучшение поедаемости корма происходит благодаря ароматному запаху действующего вещества. Эфирное масло орегано способствует активизации работы слюновыделительных желез и выработке ферментов пищеварения.

III. Порядок применения

7. Досто Грин применяют для улучшения поедаемости кормов сельскохозяйственными животными, в том числе птицами.

8. Досто Грин вводят в корма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Нормы ступенчатого ввода представлены в таблице:

Свиньи

Поросята (до 12 кг)	1000 г/т корма
Поросята (13-28 кг)	500 г/т корма
Откормыши (29-60 кг)	300 г/т корма
Откорм свиней (от 60 кг-до убоя)	200 г/т корма
Свиноматки (в течение всего периода выращивания)	300-500 г/т корма

Крупный рогатый скот

Молодняк крупного рогатого скота	500 г/т корма до макс. 1000 г/т корма
Взрослое поголовье	500 г/т корма
Дойные коровы	7 г/на одну особь в сутки в основном рационе

Сельскохозяйственная птица:

Цыплята-бройлеры (в течение всего периода выращивания)	500 г/т корма
Куры-несушки	
- с начала яйценоскости до 35-ти недельного возраста	500 г/т корма
- после 35-ти недельного возраста	300 г/т корма
Индейка	
- фаза выращивания 1	700 г/т корма
- фаза выращивания 2	600 г/т корма
- фаза выращивания 3	500 г/т корма
- фаза выращивания 4	400 г/т корма

Овцы, козы

Ягнята, козлята	500 г/т корма
Дойные овцы, козы	500 г/т корма
Взрослое поголовье	700 г/т корма

8. Досто Грин совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками

9. Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

10. Продукцию для животных и птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Досто Грином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать маску, перчатки, защитные очки. Во время работы запрещается курить, пить, принимать пищу.
12. При попадании Досто грина на слизистые оболочки его следует смыть обильным количеством воды, при аллергических реакциях обратиться к врачу. Не допускать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожу.
13. Досто Грин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Dostofarm GmbH», Германия.

(Адрес организации-производителя: Hansacker 24, 26655 Westerstede, Germany.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-11.9/03035

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 3 июня 2010 года.