

ИНСТРУКЦИЯ

ИВЕРМИН 1%

По применению Ивермин 1% для борьбы с экто - и эндопаразитами животных

Производитель - АО Дрвалевские Предприятия Биоветеринарной Промышленности, Польша

I. Общие сведения

1.1. Ивермин 1% – препарат, предназначенный для борьбы с внутренними и внешними паразитами скота и свиней. В 1 мл препарата содержится 10мг ивермектина. Препарат в виде раствора для подкожных инъекций для скота и свиней.

1.2. Выпускают препарат расфасованным по 50мл и 100мл в стеклянных флаконах.

1.3. Каждую упаковку маркируют с указанием: фирмы-производителя, адреса и товарного знака, наименования препарата, содержания действующих веществ, способа применения, даты изготовления, срока годности, массы нетто, условий хранения, номер серии, надписи „Для животных” и снабжают инструкцией по применению.

1.4. Лекарственное средство следует хранить при комнатной температуре в сухом и темном месте. Срок годности лекарственного препарата в предназначенной для продажи упаковке составляет 3 года.

II. Фармакологические свойства

2.1. Действующим веществом препарата является ивермектин, относящийся к классу гетероциклических лактонов группы эндотоксинов, получаемый из продуктов ферментации живущего в голубях актиномикоза *Streptomyces avermitilis*. Относящиеся к этому классу соединения селективно связываются с рецепторами хлористых ионов в каналах нервных и мышечных глутаминовых клеток беспозвоночных. Механизм действия ивермектина заключается в стимулировании к гиперполяризации нервных и мышечных клеток, а в результате к поражению и смерти паразита.

III. Порядок применения препарата

3.1 . Препарат применять для борьбы с внутренними и внешними паразитами скота и свиней.

Скот - нематоды желудочно-кишечного тракта: *Ostertagia ostertagi* (зрелые формы и личиночные, в том числе в спячке), *O. lyrata* (зрелые формы и личиночные) *Haemonchus placei* (зрелые формы и личиночные), *Trichostrongylus axei* (зрелые формы и личиночные), *T. colubriformis* (зрелые формы и личиночные), *Cooperia oncophora* (зрелые формы и личиночные), *C. punctata* (зрелые формы и личиночные), *C. pectinata* (зрелые ф. и личиночные), *Oesophagostromum radiatum* (зрелые ф. и личиночные), *Nematodirus helvetianus* (зрелые ф. и личиночные), *N. spathiger* (зрелые ф. и личиночные) *Bustonum phlebotomum* (зрелые ф. и личиночные), *Mecistocirrus digitatus* (зрелые ф. и личиночные), *Toxocara vitulorum* (зрелые формы). Легочные нематоды: *Dictyocaulus*

viviparus (зрелые ф. и личиночные, в том числе в спечке). Другие нематоды: *Parafularia bovcola*, *Thetazia spp.* Бычий овод (паразитические стадии): *Hypoderma bovis* и *H. lineatum*. тропический овод (паразитические стадии): *Dermatobia hominis*. Паразитические стадии мухи: *Chrysomya bezziana*. Вши: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytetrus*, *Solenopotes capillatus*. Паразитические клещи: *Psoroptes ovis*, syn. *P. communis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*. Клеши: *Ornithodoros savignyi*. Власоеды: *Damalinia bovis*. Тропический бычий клещ: *Boophilus microplus*, *B. decoloratus*. Хозиоптоз: *Chorioptes bovis*.

Свиньи нематоды желудочно-кишечного тракта: *Ascaris suum* (зрелые формы и L4), *Hystrongylus rubidus* (зрелые формы и L4), *Oesophagostomum spp.* (зрелые ф. и L4), *Strongyliodes ransomi* (зрелые ф.), *Trichuris suis* (зрелые ф.); легочные нематоды: *Metastrongylus spp.* (зрелые ф.); нематоды, паразитирующие в почках: *Stephanurus dentatus* (зрелые ф. и L4); вши: *Haematopinus suis*; паукообразные: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*. Препарат, поданный свиноматке перед родами, предотвращает инвазию у поросят *Strongyloides ransomi* через молоко.

3.2. Препарат предназначен для подкожных инъекций.

- Скот: 1 мл на 50 кг массы тела (200мг ивермектина/кг массы тела).
Сохраняя асептические условия, препарат следует подавать, вводя иглу под оттянутую кожную складку в области перед или за лопаткой.
- Свиньи: 1 мл на 33 кг массы тела (300мг ивермектина/кг массы тела).
Сохраняя асептические условия, препарат следует подавать, вводя иглу под кожу в области шеи.

3.3. Препарат не применять в случае острой почечной и печенной недостаточности.

3.4. Взаимодействия с другими препаратами отсутствуют.

3.5. Нежелательные действия - в редких случаях может появиться опухоль в месте инъекции или сильная боль. Эти реакции быстро и самопроизвольно исчезают.

3.6. Период ожидания

Съедобные ткани – 28 дней

Не применять для коров в период лактации.

IV. Меры личной профилактики

4.1. При работе с препаратом Ивермин 1% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.

4.2. Препарат Ивермин 1% не должен применяться после истечения срока годности.

4.3. Препарат Ивермин 1% следует хранить в местах, не доступных для детей

Инструкция по применению разработана Акционерным Обществом Дрвалевские Предприятия Биоветеринарной Промышленности, 05-651 Дрвалев, ул. Груецка 6, Польша