



ЗАО КОНСУЛ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ
МАСЛЯНИСТОЙ
СУСПЕНЗИИ
МАСТИЛАЙТ



РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПРЕПАРАТ ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
№ 6071-10-18 БА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ МАСЛЯНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ **МАСТИЛАЙТ**

Описание: по внешнему виду препарат представляет собой однородную густую

масляную суспензию от белого до желтоватого цвета.

Выпускают препарат в шприцах-инъекторах для внутрицистернального введения по 10 мл, упакованных по 4 шт в полиэтиленовых пакетах или по 24 шт в коробках.

Состав: в 10 мл препарата содержится: цефалексин (в виде цефалексина моногидрата) - 350 мг, гентамицин (в виде гентамицина сульфата) - 45 мг, вспомогательные вещества до 10 мл.

Показания к применению: препарат применяют при лечении коров, овец и коз, больных маститом бактериальной этиологии в период лактации. Препарат эффективен против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов благодаря сочетанному действию двух антибиотиков: цефалексина моногидрата и гентамицина сульфата.

Цефалексин - антибиотик широкого спектра действия, препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, ингибируя фермент транспептидазу и вызывая нарушение осмотического баланса и гибель клетки.

Гентамицин - антибиотик из группы аминогликозидов. Оказывает бактерицидное действие в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Действующие вещества препарата при интрацистернальном введении быстро распределяются по всей молочной железе и всасываются в кровь в незначительной степени.

Способ применения и дозы: перед применением препарата из пораженных долей вымени выдаивают содержимое, кожу сосков вымени обрабатывают антисептическим раствором (очищающей салфеткой), затем в канал соска вводят наконечник шприца-инъектора и осторожно выдавливают содержимое. Препарат вводят внутрицистернально коровам в дозе 10 мл (1 шприц-инъектор), овцам и козам - в дозе 5 мл (половина шприца-инъектора) в каждую пораженную долю вымени с интервалом 12-24 часа, 3-5 введений (в зависимости от формы течения мастита). После введения препарата наконечник шприца-инъектора извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения препарата.