Иммуноферментные исследования (ИФА)

1. Лабораторная диагностика.....стр. 2
2. Нрс антитела ИФА.....стр. 3
3. PRRS ELISA, PRRS Мультиплекс.....стр. 5
4. ИФА на антитела Mhuo.....стр. 7

1. Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика с годами стала более сложной и теперь предлагает гораздо больше возможностей, чем просто подтверждение клинических симптомов. По мере развития свиноводства и перехода к более крупным интегрированным системам роль мониторинга стада становится решающей для ветеринаров и производителей.

Система мониторинга ИФА, Мультиплекс ИФА, ПЦР предлагает легко интерпретируемые результаты перекрестного отбора проб, что дает ветеринару более полное представление о состоянии заболевания в стаде. Он сравнивает уровни титров антител между различными возрастными группами, из которых можно отслеживать статус заболевания свинок и свиноматок, чтобы указать возможные моменты заражения. Потребление молозива и уровни материнских антител у поросят можно оценить по сравнению со свиноматками и использовать для определения наилучших возможных сроков вакцинации, а также для мониторинга возможных реакций на вакцину (зависящих от вакцины). Эта ценная информация позволяет ветеринару быстро и уверенно принимать решения по протоколам лечения и управления, чтобы снизить затраты и улучшить ключевые показатели производительности для производителя.

Регулярный мониторинг является экономически эффективным способом обеспечения оптимального управления здоровьем животных, который соответствует социальной ответственности свиноводства и имеет высокую отдачу от инвестиций.

2. Нрс антитела ИФА

- Обнаружение только клинически инфицированных животных
- Обнаружение всех инвазивных серотипов
- Прогнозирование времени вакцинации
- Подтверждение успешной вакцинации

Haemophilus parasuis (болезнь Глассера)

Болезнь Глассера вызывается бактерией *Haemophilus parasuis*, которая широко распространена на всех свинофермах. Описано пятнадцать серотипов, которые различаются по способности вызывать клиническое заболевание и типам симптомов. Все эти серотипы могут присутствовать как у здоровых носителей, так и у больных свиней. Инфекция может вызывать респираторные симптомы, менингит, полисерозит и полиартрит.

1.

2.

3.

Диагностика

Классический диагноз ставится на основе сочетания клинического анамнеза + вскрытия + положительного посева. Часто диагноз не является окончательным, поскольку бактерии очень трудно культивировать. Нрс Ab ELISA основан на белке OppA, специфичном для *H. parasuis*. После того, как *H. parasuis* становится инвазивным и белок OppA попадает в иммунную систему через макрофаги, можно обнаружить антитела (рисунок 1). Классические тесты HPS ELISA основаны на ЛПС внешней мембраны, что означает, что нормальные свиньи-носители также могут дать положительный результат (2). В отличие от ELISA BioChek Нрс на основе OppA, ELISA на основе LPS выявляет только ограниченное количество серотипов Нрс.

Иммунитет, защита и профилактика

Защитный иммунитет обеспечивается антителами, которые могут быть индуцированы после естественного заражения и/или вакцинации. BioChek Нрс Ab ELISA выявляет клинически инфицированных свиней, и с помощью профилирования стада можно рассчитать время и контролировать вакцинацию. Вакцины в основном представляют собой инактивированные цельные бактерии, иммунный ответ которых будет обнаружен с помощью BioChek Нрс ELISA (3). Помимо вакцинации, для профилактики также важны хорошее/равномерное потребление поросятами молозива и избежание стресса. Оценить качество потребления молозива можно, сравнивая титры свиноматок и поросят.

Описание теста

Набор для тестирования антител к Haemophilus parasuis (Hps) позволяет измерить количество антител к OppA в сыворотке свиней. Планшеты для микротитрования были предварительно покрыты антигеном OppA. Результаты тестов будут представлены в полуколичественном виде, позволяющем различать отрицательные, низкие, умеренные и высокие серологические реакции.

Интерпретация рекомендации.

Результаты и рекомендации теста ELISA на антитела Hps:

Не вакцинированные		Уровни антител (S/P и титр)		Вакцинированные	
Не детектируются	Отрицательно	≤ 0,5	≤ 1070	Отрицательно	Не детектируются
Инфекция*	Низкий	1	2500	Низкий	Плохой иммунный ответ
	Средний	1.6	4000	Средний	
Инфекция*	Высокий	4	10500	Высокий	Вакцинный иммунитет
	Очень высокий	≥ 4,5	≥ 12000	Очень высокий	

3. PRRS ELISA, PRRS Мультиплекс (PRRS генотип I, PRRS генотип II, PCV2, Inf. A, M.hyo) разработан для удовлетворения текущих потребностей рынка в:

Обнаружение всех инфекций РРСС (генотипы I и II) и оценка момента заражения*
 (1) Оптимальная серологическая оценка вакцинации против РРСС благодаря расширенному динамическому диапазону* (2) Использование в программах скрининга и мониторинга.

РРСС (репродуктивно-респираторный синдром свиней)

Инфекция вызывает аборт у свиноматок, ранние опоросы и увеличение количества слабых и/или мертвых поросят. Респираторные симптомы чаще всего наблюдаются у поросят и откормочных стад. Существует два генотипа вируса РРСС. Генотип I (ЕС) преобладает в Европе, а генотип II (США) — в остальном мире.

Иммунитет и защита:

Реакция антител обнаруживается примерно через 10-14 дней после заражения или вакцинации. Зараженные свиньи имеют **длительную вирусемию**, преимущественно от 4-6 недель. Вирусемию и клинические симптомы можно уменьшить путем вакцинации.

Расширенный динамический диапазон: более широкий диапазон титров для лучшего различия между отрицательными, низкими, умеренными и высокими титрами и оптимального обнаружения антител как против генотипа I, так и против генотипа II.

О тест-наборе ELISA

Набор ELISA для тестирования антител к респираторному репродуктивному синдрому свиней (ИФА для определения антител к РРСС XR) позволяет измерить количество антител к РРСС в сыворотке свиней. Планшеты для микротитрования были предварительно покрыты очищенными антигенами РРСС. Будут обнаружены антитела, вызванные естественной инфекцией, и антитела, вызванные вакцинацией. Результаты тестов будут представлены в полуколичественном виде, позволяющем различать отрицательные, низкие, умеренные и высокие серологические реакции.

О тест-наборе Мультиплекс Мультиплекс (PRRS генотип I, PRRS генотип II, PCV2, Inf. A, M.hyo)

Система Luminex® MAGPIX® - это мультиплексная тестовая система для исследований в области биологических наук, предназначенная для измерения и сортировки множества сигналов, генерируемых в анализе из биологического образца. Тест представляет собой мультиплексный флуоресцентный иммунологический анализ (MFIA) использующий микросферы для обнаружения антител. В разведенной сыворотке свиней инкубируют 5 видов микросфер (каждый вид покрыты одним из антигенов: PRRSV NA (тип 2), PRRSV EU (тип 1), SIV и PCV2, M.hypopneumoniae).

Не вакцинированные		Уровни антител (S/P и титр)			Вакцинированные	
Не инфицированные	Не детектируются	Отрицательно	≤ 0,5	≤ 1070	Отрицательно	Нет инфекции
Хроническая инфекция (или совсем недавнее инфицирование)	Инфекция*	Низкий	0,5	1071	Низкий	
			1,0	2300		
Не очень старое заражение	Инфекция*	Средний	1,5	3700	Средний	Реакция на вакцинацию: НЕТ или УМЕРЕННАЯ реакция вследствие контакта с полевым вирусом (бустер эффект)
			2	5000		
			3	8000		
		Высокий	3,5	9000	Высокий	
4	1000					
Недавнее заражение	Инфекция*	Очень высокий	4,5	11000	Очень высокий	Реакция на вакцинацию с реактивацией антител вследствие контакта с вирусом в полевых условиях (бустер эффект)
			5	12000		
			≥5,5	≥13000		

* Поросята/откорм. Клинические симптомы присутствуют, другие инфекции исключены: вероятен РРСС.

Клинические симптомы при подозрении на РРСС: высокая вероятность РРСС (Проверка: поперечный профиль/диагностическое вскрытие + гистология/или парный отбор проб в ИФА + количественный ПЦР)

* Свиноматки ■ Титры > 3,0/8000 указывают на недавние контакты/инфицирования полевыми вирусами. Нужно делать ПЦР по крови и/или по абортированным/слабым/мертвоорожденным пороссятам

4. ИФА на антитела Mhyo

- Выявление инфекций *Mycoplasma hyorheumoniae* (M.hyo).
- Профилирование стада для выявления моментов заражения для разработки программ борьбы.
- Мониторинг состояния и контроль программ.
- Средний титр указывает на тяжесть пневмонии.

VION slaughter scoring system. VION Farming B.V. and ULP 2019

Микоплазма гипневмонии

M.hyo является эндемической болезнью стад во всем мире. Респираторные симптомы, связанные с инфекциями M.hyo, характеризуются сухим непродуктивным кашлем (ЭП: энзоотическая пневмония). При осложнении вторичными инфекциями клинические симптомы и влияние на увеличение веса и смертность могут резко возрасти.

Диагностика

Индивидуальный диагноз M.hyo ставится с помощью аутопсии в сочетании с гистологией и ПЦР (мультиплексная ИФА и ПЦР *Mycoplasma*) легочной ткани. Оценка поражений, подобных микоплазме на скотобойне (диагностический убой), дает информацию о распространенности и тяжести инфекции M.hyo на уровне стада. Тестирование на антитела в основном используется для клинической диагностики, составления профиля стада и мониторинга состояния. Средний титр антител M.hyo в ИФА также указывает на тяжесть поражения легких.

Иммунитет, защита и профилактика

Свиноматки и свинки часто заражают свое потомство в отделении для опороса. Профилирование стада дает информацию о состоянии производственных групп, моментах заражения и возможном воздействии инфекции M.hyo. На основе этой информации могут быть сформулированы программы управления. Борьба с заболеванием может осуществляться путем сочетания мер лечения, вакцинации и медикаментозного лечения в случаях острых вспышек.

Будущие вспышки можно предотвратить путем регулярного мониторинга производственных групп. Это позволяет принять меры до начала вспышки.

Не вакцинированные		Уровни антител (S/P и титр)		Вакцинированные	
Не детектируются	Отрицательно	≤ 0,5	≤ 1070	Отрицательно	Не детектируются
Инфекция*	Низкий	1	2300	Низкий	2-shot с коротким интервалом 1-shot вакцинация*
	Средний	1.5	3500	Средний	Усиление полевой инфекции*
Инфекция*	Высокий	2	5000	Высокий	
	Очень высокий	2.5	6300		Очень высокий
		≥ 3	≥ 7500		

*проверить клиническое влияние показателей микоплазмоподобных поражений при убое и/или аутопсии легких, включая гистологическое исследование+ПЦР